



# Sindol<sup>®</sup> Pediátrico VL Ibuprofeno Suspensión

Elaborado en Argentina

Venta Libre

Lea con cuidado esta información antes de usar este medicamento

#### ¿Qué contiene Sindol Pediátrico VL?

Cada 100 mililitros de suspensión contiene:  
Ibuprofeno micronizado 2 gramos.  
Goma guar; glicerina; polisorbato 80; ciclamato de sodio; esencia de cereza; rojo FD&C N° 2; ácido cítrico anhidro; benzoato de sodio; sorbitol 70%; agua deionizada.

#### Acción:

Calma el dolor (analgésico), la fiebre (antifebril) y la inflamación (antiinflamatorio).

#### ¿Para qué se usa Sindol Pediátrico VL?

Este medicamento se utiliza para el alivio temporario de la fiebre, dolores de garganta, dientes y cabeza, para resfríos y estados gripales que se acompañan de fiebre y/o mal estado general.

#### ¿Qué personas no pueden recibir Sindol Pediátrico VL?

NO USE este medicamento si:  
-Es alérgico al ibuprofeno y/o algunos de los ingredientes de la fórmula.  
-Menores de 2 años de edad.

#### ¿Qué cuidados debe tener antes de usar este medicamento?

Consulte a su médico:  
-Si el niño está recibiendo otra medicación  
-Presentó problemas o eventos adversos al emplear antitérmicos o antialérgicos  
-Si no logra alivio de la sintomatología en el término de un día de tratamiento, o el dolor y/o la fiebre empeoran  
-Si el dolor de garganta es severo, con dolor de cabeza, fiebre, erupción de la piel, náuseas y/o vómitos  
-Si está deshidratado (pérdida de mucho líquido) debido a vómitos, diarrea o falta de ingesta de líquidos  
-Si en el área dolorida hay enrojecimiento o tumefacción  
-Si aparecen otros síntomas, consulte a su médico antes de tomar este medicamento  
-Aunque el ibuprofeno posee las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, nunca deben administrarse juntos.  
-No utilizar como tratamiento para el dolor de estómago

**Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé consulte a su médico antes de tomar este medicamento.**

#### ¿Qué cuidados debe tener mientras usa este medicamento?

Este medicamento puede producir efectos adversos no deseados como: náuseas, vómitos, acidez, dolor estomacal, dificultad para respirar, sensación de falta de aire, vértigo, dolor de cabeza, alergias como erupción en la piel y picazón, que puede acompañarse de dificultad para respirar, hinchazón de labios, lengua, garganta o cara. En raras ocasiones este medicamento puede producir retención de líquidos o alteraciones de los análisis clínicos de laboratorio, como aumento de las enzimas hepáticas o disminución de los glóbulos blancos.

¿Cómo se usa este medicamento?  
AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR

Administrar por vía oral, de acuerdo a la siguiente tabla. Es preferible establecer la dosis a administrar de acuerdo al peso del niño, en caso de no ser posible esto, tomar como referencia la edad.

Edad	Peso del paciente	Dosis sugerida en ml*
2 a 3 años	11 a 15kg	5 ml
4 a 5 años	16 a 21 kg	7.5 ml
6 a 8 años	21 a 27 kg	10 ml
9 a 10 años	27 a 32 kg	12.5ml
Más de 10 años	Más de 32 kg	15ml

\*Cada ml de suspensión contiene 20 mg de Ibuprofeno.

La dosis que corresponda deberá ser administrada cada 8hs. No utilizar por más de 5 días para el dolor y 3 días para la fiebre.

**Modo de conservación:** conservar en lugar fresco y seco

#### ¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si usé mas cantidad de la necesaria?

Llame por teléfono a un centro de intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

#### Centros de toxicología:

Teléfonos en Buenos Aires:  
(marque 011 si reside en el interior del país)  
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez - Sánchez de Bustamante 1399 - Buenos Aires  
4962-2247 ó 4962-6666  
Policlinico Posadas - Martínez de Hoz y Marconi, Haedo.  
Commutador 4658-3001/20 - Toxicología interno 314 ó 4654-6648, 4658-7777  
Facultad de Medicina de Bs. As. - (Hospital de Clínicas Gral. San Martín) - Paraguay 2351 - Buenos Aires  
División Toxicología - Dto. de Medicina 3er. Piso, Sala II - 4961-5452/6001/04/34/46  
4962-4022/29/81/83/96 int. 480  
Servicio de Toxicología del Hospital Pedro Elizalde (Ex Casa Cuna) - Av. Montes de Oca 40 - Buenos Aires  
4301-2215

#### ¿Tiene usted alguna pregunta?

Ante cualquier duda o consulta comuníquese con Microsules Argentina al teléfono 54 3327 452629. También puede comunicarse con ANMAT respondiendo llamando al número 0800-333-1234

#### Mantener fuera del alcance de los niños

Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico

Presentaciones: frasco x 90 ml.

Elaborado en: Int. Amaro Avalos 4208, Munro, Ptdo. de Vicente López, Provincia de Buenos Aires.

Dirección Técnica: Gabriel Saez, Farmacéutico.

Especialidad medicinal autorizada por el ministerio de salud. Certificado N°: 51.708

Fecha de última revisión: 21/05/2015

#### MICROSULES ARGENTINA

Ruta Panamericana km 36,5  
(B1619IEA) Garín. Pcia. de Bs. As.  
Tel: 03327-452629  
www.microsules.com.ar

M3060136

Producto: Sindol Pediátrico Presentación: 90 ml. Código: M3060136 Dimensiones: 73 x 170 mm. Color: Negro	Controlado por:	Aprobado por:
	Firma:	Firma:
	Fecha:	Fecha: