

# FUNCIOBRON

B R O M H E X I N A

---

## MUCOLÍTICO-EXPECTORANTE

---

Elixir – Venta Libre – Industria Argentina

### LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO.

#### ¿Qué contiene Funciobron B?

Cada 100 mililitros de elixir contiene: Bromhexina Clorhidrato 80 miligramos  
Ácido Tartárico; Glicerina; Carboximetilcelulosa Sódica; Ciclamato Sódico; Sacarina Sódica; Benzoato de Sodio; Amarillo Ocaso; Esencia de Naranjas; Alcohol 96°; Sorbitol 70%; Agua purificada.

#### No usar si la tapa o el frasco están intactos.

**ACCIÓN:** Diluye la flema y facilita la expectoración de las secreciones bronquiales.

#### ¿Para qué se usa FUNCIOBRON B?

Para el alivio sintomático del catarro bronquial y la tos por fluidificación, facilitando la expectoración. La Bromhexina ayuda a disolver la flema que se genera en los bronquios cuando se padecen ciertas enfermedades respiratorias, como por ejemplo: resfriado común y gripe, entre otras. De esta manera alivia los síntomas asociados a la tos con flemas.

#### ¿Qué personas no pueden recibir FUNCIOBRON B?

NO USE este medicamento si usted es alérgico a alguno de los ingredientes, o si padece o tiene antecedentes de úlcera péptica.

**FUNCIOBRON B** no debe ser administrado a Niños menores de 12 años de edad. **FUNCIOBRON B** está contraindicado en caso de enfermedad de hígado o riñón, y en caso de antecedente de úlcera gastroduodenal.

**FUNCIOBRON B** no debe ser administrado en caso de tos crónica o en pacientes que padecen asma o tienen antecedentes de enfermedad respiratoria.

Este medicamento ha sido desarrollado para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas.

#### ¿Qué cuidados debe tener antes de usar este medicamento?

Consulte a su médico antes de ingerir este medicamento en los siguientes casos: Si usted está tomando simultáneamente algún otro medicamento, por ejemplo, para la tos. Si Ud. es mayor de 65 años de edad.

En caso de malestar persistente o aparición de dificultad para respirar, fiebre y/o expectoración abundante amarillento-verdosa o con sangre, consulte a su médico antes de tomar cualquier medicamento.

Dado que durante este tratamiento es de esperar un aumento de la secreción, puede no ser aconsejable en pacientes con dificultad para expectorar.

Si en 48 hs. los síntomas empeoran o no mejoran, consulte inmediatamente a su médico.

No administrar este producto por más de 5 días seguidos.

Durante el tratamiento con **FUNCIOBRON B** pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, raramente pueden aparecer molestias gastrointestinales (náuseas, ardor) o reacciones alérgicas, como por ejemplo: erupción de la piel, hinchazón de la cara, dificultad para respirar, aumento de la temperatura y escalofríos. Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

**FUNCIOBRON B** no debe administrarse en pacientes bajo tratamiento con disulfiram.

#### ¿Qué cuidados debe tener mientras está tomando este medicamento?

Se han reportado casos de reacciones adversas en piel de diferente gravedad, asociadas a la administración de **FUNCIOBRON B Bromhexina**. Si le aparece una lesión en piel o mucosas (boca, ojos, nariz, genitales) suspenda la medicación y consulte con su médico inmediatamente.

Reacciones de hipersensibilidad (alergia).

Exantema, urticaria (enrojecimiento, aparición de ronchas).

Reacciones alérgicas graves tales como (choque anafiláctico, angioedema) que puede manifestarse por hinchazón de la piel, tejidos subcutáneos, y mucosas de rápida progresión, asociados o no con dificultad para respirar.

Reacciones adversas graves de piel y mucosas (tales como eritema multiforme, síndrome de Steven-Johnson, necrólisis epidérmica).

#### ¿Cómo se usa este medicamento?

Vía de administración oral.

#### Elixir:

Adultos y niños mayores de 12 años: 5 ml tres veces por día.

El elixir no contiene azúcar, por lo tanto resulta adecuado también para diabéticos.

**Si el síntoma (tos) persiste por más de 5 días o empeora consulte a su médico.**

**MODO DE CONSERVACIÓN:** Conservar este producto a temperatura hasta 30° C. Mantener el envase en lugar oscuro y seco.

#### ¿Qué hacer ante una sobredosis o si tomó mas cantidad de la necesaria?

Concurra al hospital más cercano o concurra a un centro de asistencia médica o comuníquese telefónicamente con los Centros de Toxicología.

#### CENTROS DE TOXICOLOGÍA:

Teléfonos en Buenos Aires: Marque 011 si reside en el interior del país.

- *Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez:* Sánchez de Bustamante 1399 – Buenos Aires Tel.: 4962-2247 ó 4962-6666

- *Policlínico Posadas:* Martínez de Hoz y Marconi, Haedo. Tel.: 4658-3001/20 - Toxicología - Interno 314 ó 4654-6648 / 4658-7777

- *Facultad de Medicina de Bs. As. (Hospital de Clínicas Gral. San Martín):* Paraguay 2351 – Buenos Aires División Toxicología – Dto. De Medicina 3er. Piso, Sala II – Tel.: 4961-5452/6001/04/34/46 4962-4022/29/81/83/96 Int. 480

- *Servicio de Toxicología del Hospital Pedro Elizalde (Ex Casa Cuna):* Av. Montes de Oca 40 – Buenos Aires – Tel.: 4301-2215

#### ¿Tiene usted alguna pregunta?

0800-333-1234 – ANMAT RESPONDE

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**

#### FORMA DE CONSERVACION:

Conservar este producto a temperatura hasta 30° C. Mantener el envase en lugar oscuro y seco.

#### PRESENTACIONES:

Envases conteniendo 1 frasco de 120 ml.

Elaborado en: Intendente Amaro Ávalos 4208 – Munro - Ptdo. de Vicente López, Pcia. de Buenos Aires.

Dirección Técnica: Gabriel Saez – Farmacéutico.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud Certificado N°: 49.630

Fecha de última revisión del prospecto autorizado por la ANMAT: 03/08/2016

Microsules Argentina S.A. de S.C.I.I.A. – Ruta Panamericana KM 36,5 (B1619)EA  
Garín, Pdo. de Escobar, Pcia. de Buenos Aires

Tel.: 03327-452629

www.microsules.com.ar