



ANTIALERGICO

24 hs
de alivio

1 sola
toma diaria

ESTORNUDOS • LAGRIMEO • PICAZÓN • ALERGIA DE PIEL

Alergiano®

Loratadina

Comprimidos Recubiertos 10 mg - Jarabe 1 mg/ml

ELABORADO EN ARGENTINA - VENTA LIBRE

LEA CON CIUDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO

¿QUÉ CONTIENE ALERGIANO?

Cada comprimido recubierto contiene:

Loratadina 10,00 miligramos, Celulosa Microcristalina PH 200, Almidón Glicolato Sódico, Talco, Estearato de Magnesio, Hidroxipropilmetilcelulosa E15, Polietilenglicol 6000, Dióxido de Titanio.

Cada mililitro de jarabe contiene:

Loratadina 1,00 miligramo
Propilenglicol, Glicerina, Sorbitol 70%, Ácido cítrico monohidrato, Benzoato de Sodio, Azúcar, Esencia de frutilla, Agua purificada

LOS COMPRIMIDOS SE PRESENTAN EN BLISTER DE ALUMINIO Y PVC. SI EL PVC O EL ALUMINIO SE ENCUENTRAN ROTOS O AVERIADOS, NO UTILICE EL PRODUCTO.

NO USAR SI LA TAPA O EL FRASCO NO ESTÁN INTACTOS.

ACCIÓN:

Antialérgico

¿PARA QUE SE USA ALERGIANO?

Alergiano está indicado para el alivio temporario de los síntomas causados por alergias respiratorias, como ser: Secreción nasal, estornudos, lagrimeo y picazón en los ojos, nariz y/o garganta., También está indicado en caso de alergia de la piel, ronchas o urticaria acompañados o no de picazón.

¿QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR ALERGIANO?

NO USE ALERGIANO si usted es alérgico a alguno de los componentes de la fórmula.

ALERGIANO se encuentra contraindicado además, durante el Embarazo, la Lactancia, Niños menores de 6 años de edad, para la forma farmacéutica jarabe y menores de 12 años de edad para la forma farmacéutica comprimidos, pacientes que padecen enfermedad hepática o renal o crisis asmática.

Si usted está tomando algún medicamento o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico ante de ingerir este medicamento.

CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO.

Este medicamento ha sido desarrollado para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Conducción y uso de máquinas: Observe su respuesta a la medicación, porque puede producir disminución de la capacidad de reacción o somnolencia a las dosis recomendadas.

Si así fuera, absténgase de conducir y manejar maquinaria peligrosa.

Si usted tiene problemas de enfermedades hepáticas o renales consulte a su médico antes de tomarlo.



Si usted está tomando algún medicamento consulte con un médico antes de ingerir este medicamento. ALERGIANO se encuentra contraindicado durante el Embarazo y la Lactancia. Suspender el tratamiento 48 hs antes de efectuar cualquier tipo de prueba cutánea, ya que los antialérgicos pueden impedir o disminuir las reacciones que, de otro modo, serían positivas.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO ESTE MEDICAMENTO?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento. Ocasionalmente puede producir cansancio, sedación y dolor de cabeza. En pacientes pediátricos se ha observado nerviosismo. Suspender su uso y consulte a su médico si aparecen estos síntomas.

¿COMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

ALERGIANO Comprimidos: Adultos y Mayores de 12 años:
1 comprimido (10 mg) por día; no más de 1 comprimido en 24 horas.

ALERGIANO Jarabe: Niños de 6 a 12 años de edad, con peso menor a 30 kg, 5 ml (5 mg) 1 vez por día, niños con peso mayor a 30 kg., 10 ml (10 mg) una vez por día.

La duración del tratamiento no debe superar los 5 días ininterrumpidos.
Vía de Administración: Se administra por vía Oral

¿QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI USÉ MAS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

CENTROS DE TOXICOLOGÍA:

Teléfonos en Buenos Aires: (Marque 011 si reside en el interior del país)
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez - Sánchez de Bustamante 1399 – Buenos Aires
4962-2247 ó 4962-6666
Policlínico Posadas - Martínez de Hoz y Marconi, Haedo.
Conmutador 4658-3001/20 - Toxicología interno 314 ó 4654-6648, 4658-7777
Facultad de Medicina de Bs. As. - (Hospital de Clínicas Gral. San Martín) - Paraguay 2351 – Bs. As.
División Toxicología – Dto. De Medicina 3er. Piso, Sala II - 4961-5452/6001/04/34/46
4962-4022/29/81/83/96 Int. 480
Servicio de Toxicología del Hospital Pedro Elizalde (Ex Casa Cuna)
Av. Montes de Oca 40 – Buenos Aires 4301-2215

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

0800-333-1234 ANMAT RESPONDE

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**

FORMA DE CONSERVACION:

Proteger de la luz y la humedad. Entre 10° C y 30° C

Presentaciones:

Comprimidos: Envases conteniendo 10 comprimido y envases conteniendo 120, 200, 250, 500 y 1000 comprimidos, siendo éstas 5 (cinco) presentaciones de venta de USO HOSPITALARIO EXCLUSIVO
Jarabe: Envase que contiene 1 frascos 60, 100 , 120, 150 y 200 ml y envases que contienen 12, 24 y 48 frascos por 60, 100, 120, 150 y 200 ml, siendo estas últimas 15 (quince) presentaciones de venta de USO HOSPITALARIO EXCLUSIVO.

Elaborado en: Av. 12 de octubre N° 4444 - Quilmes. Buenos Aires - Argentina
Dirección Técnica: Jorge A. Moglia – Farmacéutico
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud
Certificado N°: 50.860
Fecha de última revisión del prospecto autorizado por la ANMAT: 19/10/2015 Disposición 8638