

11x14cm

frente

Copiron 400mg

IBUPROFENO 400 mg

Comprimidos Recubiertos
Venta Libre - Industria Argentina

COMPOSICIÓN

Cada comprimido recubierto contiene:
Ibuprofeno 400 mg

Excipientes: Celulosa microcristalina 240 mg; Alcohol polivinílico/dióxido de titanio/ PEG 3000/ talco 19.5 mg;
Estearato de magnesio 5.3 mg; Croscarmelosa sódica 3.2 mg; Dióxido de silicio 1.5 mg; Antiespumante 19.5 µg;
Amarillo ocaso, laca aluminica 9.2 µg

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Analgésico – Antifebril – Antiinflamatorio

USO DEL MEDICAMENTO: LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN

Esta indicado para el alivio sintomático de dolores (de espalda, de cabeza, menstruales, musculares, dientes), dolores producidos por artritis, dolores asociados a estados gripales y para reducir la fiebre.

COMO USAR ESTE MEDICAMENTO

Adultos y mayores de 15 años: 1 comprimido cada 6 u 8 horas mientras los síntomas persistan. Dosis máxima: 1200 mg/día (3 comprimidos de 400 mg). Tomar el medicamento preferentemente después de las comidas.

Mayores de 65 años: consulte a su médico.

Niños menores de 15 años: consulte con su médico.

CONTRAINDICACIONES

Alergia al Ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios.
Insuficiencia hepática y renal.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- No usar este medicamento por más de 5 días para el dolor o más de 3 días para la fiebre.
- Si los síntomas continúan o si el área dolorida esta roja o hinchada, deberá consultar al médico.
- Si usted consume 3 (tres) o más vasos de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.
- Aunque el Ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que la Aspirina y el Paracetamol, no deben administrarse juntos excepto bajo supervisión médica.
- La ingesta de Ibuprofeno puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente.
- Consulte a su médico antes de tomar Ibuprofeno si sufre de úlcera gástrica o duodenal, enfermedades del hígado o riñón, hipertensión arterial y/o insuficiencia cardiaca.

dorso

Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Si usted padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo Hipertensión arterial, Diabetes, Hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, etc. deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor o 3 días para la fiebre.

REACCIONES ADVERSAS

Este medicamento puede producir náuseas, acidez, trombocitopenia (disminución en el número de plaquetas), reacciones de hipersensibilidad (erupción, picazón, urticaria), dolor estomacal, trastornos en el tránsito intestinal, mareos y cefaleas.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS

Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de consumir este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

SOBREDOSIS

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez – Tel. (011) 4962-6666/2247

Hospital Dr. Alejandro Posadas – Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel.: (0221) 451-5555

TODO MEDICAMENTO DEBE PERMANECER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

“Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico”

Conservación: Conservar en lugar seco a temperatura ambiente.

Seguridad del envase: verificar que los blister no presenten rotura.

Presentación

COPIRON 400 mg: Envases con 10, 20 y 500 comprimidos recubiertos.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 42.986

Director Técnico: Gabriel Saez – Farmacéutico.

MICROSULES ARGENTINA S.A. de S.C.I.I.A.

Ruta Panamericana Km. 36,5

B 1619 IEA Garín, Pcia. de Buenos Aires

TE 03327 452629

www.microsules.com.ar

Elaborado en: Galicia 2652, C.A.B.A.

Fecha de la última revisión: 08 de Abril de 2011.

M3060322-1